

 OPEN HERE

HOIATUS / UZMANĪBU / ATSARGIAI



EE

Zorvec Enicade on fungitsiid, mida kasutatakse kartuli-lehemädaniku (*Phytophthora infestans*) tõrjeks.

Toodet võib osta ja kasutada ainult

taimekaitsetunnistust omav isik.

Toimeained: oksatiapiproliin 100 g/l

Preparaadi vorm: õldispersioon (OD).

Eesti reg. nr.: 769/20.11.19

Valmistamise aeg: vaata pakendil

Partii nr.: vaata pakendil

Säilivusaeg: 3 aastat

Registreerimise haldaja, tootja ja pakendaja: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 København K, Taani

Corteva Agriscience Denmark A/S consultant Eestis:
Tel. +372 5855 7473, www.corteva.ee

LV

Fungicīds kartupeļu lakstu puves (*Phytophthora infestans*) ierobežošanai kartupeļu stādījumos.

Darbigās vielas: oksatiapiproliins 100 g/L

Preparaatīvā forma: dispersija eļļā (OD)

Reģistrācijas Nr.: 0673

Reģistrācijas klase: 2

Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.

Derīguma termiņš: 3 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Kopenhāgena K, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā:
Corteva Agriscience, Tālr.: +371 2897 5155,
www.corteva.lv

LT

Zorvec Enicade - tai sisteminio ir translaminarinio veikimo fungicidas, skirtas apsaugoti bulves nuo bulvių maro (*Phytophthora infestans*).

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: oksatiapiproliinas 100 g/l (10,13 %)

Produkto forma: aliejinė koncentruota suspensija (OD)

Registracijos Nr.: AS2-59F(2022)

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 3 metai.

Preparatą registruo: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Kopenhaga K, Danija

Corteva Agriscience Denmark A/S atstovas Lietuvoje: Corteva Agriscience Lithuania UAB, Spaces Gedimino pr 44A, LT-01110, Lietuva. Tel. +370 5 2100260, www.corteva.lt

 CORTEVA[™]
agriscience

ZORVEC
Enicade[™]

FUNGICIDAS/FUNGICĪDS/FUNGITSIID

GROUP 49 FUNGICIDE

UFI: A2PA-20RT-X00E-J4E5

[™] Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies



NETOKOGUS / NETO /
GRYNASIS KIEKIS: 0,3 L e

283225 2312 - ESTONIA, LATVIA, LITHUANIA



50X20MM MINIMUM
NO TEXT NO COLOR ON THIS ZONE
(THIS SQUARE MUST BE DELETED BEFORE PRINTING)

HOIATUS / UZMANĪBU / ATSARGIAI



(EE)

Zorvec Enicade on fungitsiid, mida kasutatakse kartuli-lehemädaniku (*Phytophthora infestans*) tõrjeks.

Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Toimeained: oksatiapiproliin 100 g/l

Preparaadi vorm: õldispersioon (OD).

Eesti reg. nr.: 769/20.11.19

Valmistamise aeg: vaata pakendil

Partii nr.: vaata pakendil

Säilivusaeg: 3 aastat

Registreerimise haldaja, tootja ja pakendaja: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 København K, Taani

Corteva Agriscience Denmark A/S consultant Eestis:
Tel. +372 5855 7473, www.corteva.ee

(LV)

Fungicīds kartupeļu lakstu puves (*Phytophthora infestans*) ierobežošanai kartupeļu stādījumos.

Darbīgās vielas: oksatiapiproliins 100 g/L

Preparatīvā forma: dispersija eļļā (OD)

Reģistrācijas Nr.: 0673

Reģistrācijas klase: 2

Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.

Derīguma termiņš: 3 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Kopenhāgena K, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā:
Corteva Agriscience, Tālr.: +371 2897 5155,
www.corteva.lv

(LT)

Zorvec Enicade - tai sisteminio ir translaminarinio veikimo fungicidas, skirtas apsaugoti bulves nuo bulvių maro (*Phytophthora infestans*).

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: oksatiapiprolinas 100 g/l (10,13 %)

Produkto forma: aliejinė koncentruota suspensija (OD)

Registracijos Nr.: AS2-59F(2022)

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 3 metai.

Preparatą registravo: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Kopenhaga K, Danija

Corteva Agriscience Denmark A/S atstovas Lietuvoje: Corteva Agriscience Lithuania UAB, Spaces Gedimino pr 44A, LT-01110, Lietuva. Tel. +370 5 2100260,
www.corteva.lt



CORTEVA
agriscience

ZORVEC
EnicadeTM

FUNGICIDAS / FUNGIČĪDS / FUNGITSIID

GROUP 49 FUNGICIDE

UFI: A2PA-20RT-X00E-J4E5

TM Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

**NETOKOGUS / NETO /
GRYNASIS KIEKIS: 0,3 L e**



283225 2312 - ESTONIA, LATVIA, LITHUANIA

EE

EUH401: Inimeste tervise ja keskkonnaohutuse vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

P261 Vältida auru ja pihustatud aine sissehingamist

P273 Vältida sattumist keskkonda.

P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.

P333 + P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

HOIATUS



HÄDAABI TELEFON 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

**Lietošanas instrukcija latviski seko pēc teksta igauņu valodā.
Naudojimo instrukcija lietuviškai pateikiama po estišku ir latvišku tekstu.**

Keskkonnaohtlikkus

Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Taara purunemisel

Mahaläinud preparaat koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Juhul, kui preparaati pole võimalik teistmoodi ohustada, tuleb mullale sattunud aine eemaldada koos pinnasekihiga, koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

TOIMEMECHANISM JA KULTUURID

Zorvec Enicade on fungitsiid, mida kasutatakse kartuli-lehemädaniku (*Phytophthora infestans*) tõrjeks. Fungitsiidil on translaminaarne ja süsteemne toime ning seda peab kindlasti kasutama ennetavalt.

Töödeldud lehtedes on translaminaarse toime tulemuseks ühtlasem kaitse haiguste eest ja ksüleemisisene süsteemne toime aitab kaitsta neid lehti, mis ei ole pritsimise ajal veel täielikult välja arenenud, samuti kaitseb uusi kasvavaid lehti.

Zorvec Enicade fungitsiid omab mõju oomütsetide suhtes ning pärsib mütseeli ehk seeneniidistiku kasvu, spooride moodustumist ja zoosporide idanemist.

KASUTAMISE TINGIMUSED

Kasuta Zorvec Enicade fungitsiidi heade kasvutingimuste ajal. Välti kasutamist taimedel, mis kannatavad stressi all.

Ooteaeg – viimase pritsimise ja koristuse vahele peab jääma vähemalt 7 päeva.

KULUNORMID JA KASUTUSAEG

Kasuta Zorvec Enicade fungitsiidi kulunormiga 0,15 l/ha paagisegus koos teise fungitsiidiga, mis on sobilik kasutamiseks kartulil ning millel on teistsuguse toimemehhanismiga mõju. Zorvec Enicade kasutamine ei tohi ületada 1/3 pritsimisi, mida tehakse kultuuril hooaja jooksul kartuli-lehemädaniku vastu. Zorvec Enicade fungitsiidiga võib pritsida ühe kasvuhooaja jooksul maksimaalselt 3 korda järjest.

Soovituslik on kasutada 10 päevaste intervallidega, kuid suure haiguse leviku ajal võib kasutada ka 7 päevast intervalli.

Kõige varasem pritsimise aeg on BBCH 35 (kui varred ja stoolonid on kuni 50% iseloomulikust pikkusest ja külgharud on alustanud kasvu).

Viimane pritsimine võib toimuda minimaalselt 7 päeva enne koristust.

Kõige ideaalsem on pritsida ennetavalt, enne esimeste nähtavate haigustunnuste ilmumist.

Kultuur	Kulunorm	Maksimaalne arv kasutuskordi kasvuperioodi jooksul	Minimaalne-maksimaalne pritsimiste vahe	Kontrollitavad haigused
Kartul	0,15 l/ha	4*	7-10 päeva**	Kartuli-lehemädanik (<i>Phytophthora infestans</i>)

*Ära kasuta järjestikku rohkem kui 3 korda.

** Kasuta lühikest intervalli, kui on kõrge risk haiguse levikuks.

VIHMAKINDLUS

Zorvec Enicade on vihmakindel 20 minutit peale pritsimist.

VILJAIKALDUS

Järgnevate kultuuride osas piirangud puuduvad.

JÄRELKULTUURID

Järelkultuuride osas piirangud puuduvad normaalse viljavahelduse korral.

PAAGISEGU

Zorvec Enicade fungitsiidi on kohustuslik kasutada paagisegus koos teiste

kartuli-lehemädaniku tõrjeks registreeritud preparaatidega. Paagisegusid puudutavate küsimuste korral võtke juhiste saamiseks ühendust kohaliku esindajaga.

ISIKUKAITSEVAHENDID

Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.

TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE

Kontrolli paagi puhtust. Täida pool pritsipaaki puhta veega ja alusta segamist. Lisa vajalik kogus toodet pritsipaaki, täida paak veega, jätkates segamist. Loputa tühja kanistrit vähemalt kolm korda puhta veega ja lisa loputusvesi pritsipaaki, valmistatava töölahuse hulka. Valmistatud töölahus tuleb koheselt ära kasutada.

PRITSIMISTEHNOLOGIA

Zorvec Enicade't kasutatakse traktori külge kinnitatud või iseliikuva taimekaitsepritsiga.

Enne tööle asumist kontrolli torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Soovitav pritsimiskogus on 200 kuni 400 liitrit vett hektari kohta. Madalaimat veekogust kasutage ainult väga hõreda taimiku puhul. Hilisemate pritsimiste korral, kui taimik on tihe, peaks veekogust suurendama 300-400 liitrini vett hektari kohta.

PAAGI PUHASTAMINE

Sõltumata täiteseadmest pritsitakse ülejäänud pritsimisvedelik ja loputusvesi töödeldavale piirkonnale laiali.

Lahuse täitesead: sõltumata täiteseadest pritsitakse pritsimislahuse jäägid ja loputusvesi töödeldud alale. Loputusvee paagi maht peab olema piisav, et lahjendada pritsimislahuse jääke vähemalt 50 korda. Kui kasutate sisemisi pihusteid, peske pritsipaak koheselt pärast kasutamist puhtaks loputusveepaagist pärineva veega. Soovitav on jagada loputusvesi erinevate loputuste vahel ning korrata paagi pesu ja pritsimist 2-3 korda. Loputusvesi pritsitakse sõites töödeldud alale.

RESISTENTSUS

Toode	Tüüp	Toimeaine	FRAC-rühm	Resistentsuse kujunemise risk
Zorvec Enicade	FUNGITSIID	Oksatiapiproliin	F9#49	Keskmine kuni kõrge

Zorvec Enicade sisaldab oksatiapiproliini. Oksatiapiproliin kuulub FRAC gruppi F9#49 (toimib oksüsterooli siduva valgu modulaatorina seene rakkudes). Oksatiapiproliinil ei esine ristresistentsust teiste samasse klassi kuuluvate fungitsiididega, mida kasutatakse oomütseet patogeenide vastu, sealhulgas karboksüülhappe amiid (CAA), fenüülamiid, tsümoksaniil ja Qol fungitsiidid.

Vähendamaks resistentsuse ohu teket, tuleks Zorvec Enicade fungitsiidi kasutada pritseprogrammides koos teise toimeviisiga toodetega.

Zorvec Enicade fungitsiidi tuleb alati kasutada paagisegus koos teiste kartuli-lehemädaniku tõrjeks ettenähtud toodetega. Tooted, mida paagisegus koos kasutatakse, peavad olema erinevate toimeviisidega.

Oluline on järgida etiketil ettenähtud pritsimiskordade arvu ja kulunormi.

Pärast Zorvec Enicade (või mis tahes muu FRAC F9 # 49 koodi sisaldava toote) kasutamist pritsimisprogrammis on soovitatav kasutada teistsuguse toimemehhanismiga kartulile mõeldud fungitsiidi, millel on raviv toime.

HOIUTINGIMUSED

Hoida ainult originaalpakendis, varustatuna etiketiga, tihedalt suletuna, ohutus, jahedas, kuivas ja lukustatud kohas mitte alla 0°C ja üle +30°C. Hoida otsese päikesekiirguse ja soojusallika eest ning hoida külma eest kaitstud kohas. Säilitada suletuna ning lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast.

TAARA KAHJUTUSTAMINE

Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi.

Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele. Kemikaalijäägid anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Mahavalgunud preparaat koguda kokku absorbeeriva ainega spetsiaalsesse vastavalt markeeritud anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Tähelepanu!

Tootja poolt pakutud toode on kõrge kvaliteediga ja kasutajale sobiv. Tootjal puudub kontroll selle üle, kuidas toimub kasutajapoolne hoiustamine, käitlemine, segamine teiste toodetega, kasutamine ning millised on ilmastikutingimused enne kasutamist, kasutamise ajal ning peale kasutamist. Seega sellest tulenevalt ei saa tootja selle eest ka vastutada.

Tootja ei vastuta ka kahjustuste eest, mis on tekkinud hooletuse või preparaadi ebaõige kasutamise tagajärjel. Preparaadi kvaliteet on tagatud vaid juhul, kui seda säilitatakse suletud originaalpakendis. Kõik soovitusel preparaadi kasutamise kohta on antud arvestades tootja olemasolevaid kogemusi. Kuna preparaadi säilitamine ja kasutamine ei toimu tootja kontrolli all, vastutab kõigi võimalike kahjude eest kasutaja.

LV

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

P333 + P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību

P391 Savākt izšķakstīto šķidrumu.

P501 Atbrīvojies no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu.

Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Uzmanību



Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana. Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs: 67042473

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Strādājot ar preparātu. Ietotiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, aizsargbrilles, ķīmiski izturīgus cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties novilkt apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

PREPARĀTS UN TĀ IEDARBĪBAS VEIDS

Zorvec Enicade ir fungicīds, ko izmanto kartupeļu lakstu puves (*Phytophthora infestans*) ierobežošanai kartupeļu stādījumos. Fungicīdam piemīt translamināra un sistēmiska iedarbība un to ieteicams lietot profilaktiski.

Produkta translaminārā kustība uz apstrādātajām auga daļām veido vienmērīgu aizsardzību, kā arī kustīgums vadaudu sistēmā palīdz aizsargāt arī jaunus dzinumus, kas izauguši pēc fungicīda lietošanas. Zorvec Enicade ir paredzēts tieši oomicēšu ierobežošanai. Tas nomāc micēlija augšanu, sporulāciju un zoosporu dīgšanu.

LIETOŠANAS LAIKS

Zorvec Enicade lietot labos augšanas apstākļos. Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc signāla par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Nelietot kultūraugos, kuri cieš no stresa.

NOGAIDĪŠANAS LAIKS

Nelietot vēlāk kā 7 dienas līdz ražas novākšanai.

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVA

Zorvec Enicade ar devu 0,15 l/ha jālieto maisījumā ar citu fungicīdu, kuram ir atšķirīgs iedarbības mehānisms. Zorvec Enicade lietošanas reizes nedrīkst

pārsniegt 1/3 daļu no sezonas kopējo apstrāžu skaita, kurās paredzēts ierobežot kartupeļu lakstu puvi, kā arī nedrīkst lietot vairāk kā 3 apstrādēs pēc kārtas.

Ieteicams starp apstrādēm ievērot 10 dienu intervālu, augstas slimības intensitātes apstākļos dienu skaitu starp apstrādēm samazinot līdz 7 dienām. Agrākais apstrādes laiks kartupeļiem ir sākot ar AS 35 (50% no augiem ir saskārušies vagās).

Vēlākā apstrāde 7 dienas līdz ražas novākšanai.

Kultūraugs	Deva	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā	Intervāls starp apstrādēm	Kaitīgais organisms
Kartupeļi	0,15 l/ha	4*	7-10 dienas**	kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>)

*Pēc kārtas nelietojot vairāk kā trijās apstrādēs.

**Augstas slimības intensitātes apstākļos, starp apstrādēm ievērot 7 dienu nogaidīšanas intervālu.

LIETUS NOTURĪBA

Zorvec Enicade kļūst noturīgs pret lietu 20 minūtes pēc apstrādes.

PĀRSĒJA

Ja apstrādātais stādījums ir gājis bojā, var sēt jebkuru kultūraugu.

PĒCKULTŪRAS

Nav ierobežojumu pēckultūru izvēlē.

TVERTNES MAISIJUMI (SAVIENOJAMĪBA)

Zorvec Enicade var lietot maisījumā ar citu augu aizsardzības līdzekli, kuru paredzēts lietot kartupeļu lakstu puves ierobežošanai. Jautājumos par tvertnes maisījumiem kontaktējieties ar firmas pārstāvi Latvijā.

SMIDZINĀŠANAS TEHNIKA UN ŪDENS DAUDZUMS

Zorvec Enicade smidzināšanai var izmantot jebkura tipa smidzinātājus.

Rekomendējamais Zorvec Enicade darba šķidrums patēriņš 200 līdz 400 litri uz hektāru. Mazāko ūdens daudzumu lietot tikai gadījumos, kad ir ļoti rets kultūraugu stādījums. Vēlāk sezonā ūdens daudzumu nepieciešams palielināt līdz 300-400 litriem uz hektāru.

SMIDZINĀTĀJU TĪRĪŠANA

Smidzinātājiem ar darba šķidrums sagatavošanas tvertni

Smidzināšanas maisījumu atlikumiem un skalojamajam ūdenim ir jābūt

izsmidzinātam uz lauka vai īpašā skalošanas vietā neatkarīgi no smidzinātāju uzpildīšanas specifikas. Skalošanas tvertnes ūdens atlikumam jābūt tādām, lai atlikušo smidzināšanas šķidrumu varētu atšķaidīt vismaz 50 reizes. Izskalojiet smidzinātāja tvertni nekavējoties pēc skalojamā ūdens iepildīšanas, izmantojot smidzinātāja tvertnes skalojamās sprauslas. Tvertnes skalošanas ūdens var tikt sadalīts tā, lai atsevišķu skalošanu un izsmidzināšanu varētu veikt 2-3 reizes. Tvertnes skalošanas šķidrumu izsmidzina, šķērsojot apstrādāto lauku.

SMIDZINĀTĀJU TĪRĪŠANA NO ĀRPUSES

Smidzinātāja un traktora tīrīšana ir jāveic, vai nu uz apstrādātās platības, vai arī jāizmanto speciāls tīrīšanas laukums, kurā ir ierīkots atsevišķs atlikumu savākšanas kontainers. Tīrot smidzinātāju uz lauka, smidzinātājam ir jābūt aprīkotam ar nepieciešamajām mazgāšanas iekārtām, kā arī mazgājamā ūdens daudzumam jābūt pietiekamam.

PRETRESISTENCES STRATĒGIJA

Zorvec Enicade satur darbīgo vielu oksatiapiproflīnu. Oksatiapiproflīnam nepiemīt krusteniska rezistence ar citiem fungicīdiem, kuri tiek lietoti oomicēšu patogēnu ierobežošanai. Nav novērota krusteniska rezistence arī pret karboksilgrupas amīdiem, fenilamīdiem, cimoksanilu un kvinonu fungicīdiem.

Lai ierobežotu rezistences veidošanas risku, Zorvec Enicade lietot smidzināšanas

programmās ar produktiem, kuriem ir atšķirīgs iedarbības mehānisms. Zorvec Enicade, vienmēr jālieto programmās ar produktiem, piem., augu aizsardzības līdzekļu, kuri satur darbīgās vielas - mankocebu, fluazināmu vai mandipropamīdu. Ir svarīgi nepārsniegt uz marķējuma norādīto maksimālo apstrāžu skaitu sezonā. Pēc Zorvec Enicade (vai jebkura cita produkta, kas satur FRAC F9/ 49) izsmidzināšanas augu aizsardzības programmā ieteicams lietot citu kartupeļu fungicīdu, kam ir ārstējoša iedarbība.

Produkta nosaukums	Veids	Darbīgā viela	iedarbības veida kods/ FRAC* kods	Rezistences veidošanās riska pakāpe
Zorvec Enicade	fungicīds	oksatiapiprolīns	F9/49	Vidēja līdz augsta

*FRAC (Fungicīdu pretrezistences komiteja)

TUKŠĀ TARA

Iepakojumu pēc iztukšošanas tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes un skalojamo ūdeni izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Iepakojumu nedrīkst lietot atkārtoti. Tas jāuzglabā speciāli iekārtotā vietā un to likvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt sausā un no sala pasargātā vietā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš: 3 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.


VIDES AIZSARDZIBA

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA


Visi mūsu piegādātie produkti ir augstas kvalitātes un mēs esam pārliecināti par to piemērotību lietošanai, taču tā kā mēs nevaram nodrošināt kontroli pār uzglabāšanu, transportēšanu, jaukšanu un lietošanu, kā arī par laika apstākļiem pirms apstrādes, apstrādes brīdī un pēc apstrādes, kas var

ietekmēt produkta iedarbības efektivitāti, visi nosacījumi un garantijas, likumā noteiktās vai citas, attiecībā uz mūsu produkta kvalitāti vai piemērotību jebkādai tā lietošanai, nav ietverti. Ne mēs, ne mūsu tirdzniecības partneri neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies produkta nepareizas uzglabāšanas, transportēšanas vai lietošanas rezultātā. Šos nosacījumus nevar mainīt ne mūsu darbinieki, ne pārstāvji, neatkarīgi no tā, vai tie pārrauga vai piedalās produktu lietošanā.


	
Package MID :	283225 2312
Trade Name :	ZORVEC ENICADE
Country :	ESTONIA, LATVIA, LITHUANIA
Nbre pages (max. 24 p.):	20 pages
Size :	155x70 mm
Artwork Type :	BKL 195x70 mm
Specification :	EU5038
Printer :	EMEA - CCL Label Italy
Packing Location :	EMEA - SOLFOTECNICA COTIGNOLA (F495/F455/IT28-2414)
Ticket No :	N/A
Date :	2312
Proof Cycle No :	1
COLOUR REFERENCES	
Number of Coulours used :	4
<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="background-color: cyan; padding: 2px 5px;">Cyan</div> <div style="background-color: magenta; padding: 2px 5px;">Magenta</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px 5px;">Jaune</div> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">Noir</div> </div>	
Last updated by :	HOP!

PAGE 12

70 mm



155 mm





LT

Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiovimą arba skilinėjimą.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerolio.
Mūvēti apsaugines pirštines.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Surinkti ištekėjusių medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 52362052 arba 8 687 533 78.

ATSARGIAI

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!


NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS


VEIKIMO BŪDAS

Zorvec Enicade - sisteminio ir translaminarinio veikimo fungicidas, skirtas bulvių apsaugai nuo bulvių maro (*Phytophthora infestans*). Translaminarinis veikimas (geba prasiskverbti į lapą) apsaugo apdorotus augalo lapus ir užtikrina vienodesnę apsaugą, sisteminis veikimas padeda apsaugoti lapus, kurie dar nėra visiškai išsiskleidę apdoravimo produktu metu. Zorvec Enicade stabdo micelio augimą, sporuliaciją ir zoosporų dygimą.

PURŠKIMO LAIKAS IR NORMA


Augalai	Norma	Didžiausias purškimų skaičius	Purškimo laikas	Intervalas tarp purškimų	Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo	Ligos
Bulvės	0,15 l/ha	4	nuo tada, kai tarpuvagiuose susilieja 50% augalų (BBCH 35)	7-10 dienų	7 dienos	Bulvių maras (<i>Phytophthora infestans</i>)

	
Package MID :	283225 2312
Trade Name :	ZORVEC ENICADE
Country :	ESTONIA, LATVIA, LITHUANIA
Nbre pages (max. 24 p.):	20 pages
Size :	155x70 mm
Artwork Type :	BKL 195x70 mm
Specification :	EU5038
Printer :	EMEA - CCL Label Italy
Packing Location :	EMEA - SOLFOTECNICA COTIGNOLA (F495/F455/IT28- 2414)
Ticket No :	N/A
Date :	2312
Proof Cycle No :	1
COLOUR REFERENCES	
Number of Coulours used :	1
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">Noir</div>	
Last updated by :	HOP!






Package MID :	283225 2312
Trade Name :	ZORVEC ENICADE
Country :	ESTONIA, LATVIA, LITHUANIA
Nbre pages (max. 24 p.):	20 pages
Size :	155x70 mm
Artwork Type :	BKL 195x70 mm
Specification :	EU5038
Printer :	EMEA - CCL Label Italy
Packing Location :	EMEA - SOLFOTECNICA COTIGNOLA (F495/F455/IT28- 2414)
Ticket No :	N/A
Date :	2312
Proof Cycle No :	1
COLOUR REFERENCES	
Number of Couloours used :	1
Noir	
Last updated by :	HOP!






PAGE 15


Package MID :	283225 2312
Trade Name :	ZORVEC ENICADE
Country :	ESTONIA, LATVIA, LITHUANIA
Nbre pages (max. 24 p.):	20 pages
Size :	155x70 mm
Artwork Type :	BKL 195x70 mm
Specification :	EU5038
Printer :	EMEA - CCL Label Italy
Packing Location :	EMEA - SOLFOTECNICA COTIGNOLA (F495/F455/IT28- 2414)
Ticket No :	N/A
Date :	2312
Proof Cycle No :	1
COLOUR REFERENCES	
Number of Couloours used :	1
	
Last updated by :	HOP!



ZORVEC ENICADE LT-LV-EE 0.3L BKT 283225 2312 (iss 1).indd 15

21/12/2023 07:24

	
Package MID :	283225 2312
Trade Name :	ZORVEC ENICADE
Country :	ESTONIA, LATVIA, LITHUANIA
Nbre pages (max. 24 p.):	20 pages
Size :	155x70 mm
Artwork Type :	BKL 195x70 mm
Specification :	EU5038
Printer :	EMEA - CCL Label Italy
Packing Location :	EMEA - SOLFOTECNICA COTIGNOLA (F495/F455/IT28- 2414)
Ticket No :	N/A
Date :	2312
Proof Cycle No :	1
COLOUR REFERENCES	
Number of Coulours used :	1
<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">Noir</div>	
Last updated by :	HOP!





PAGE 17


Package MID : 283225 2312
Trade Name : ZORVEC ENICADE
Country : ESTONIA, LATVIA, LITHUANIA
Nbre pages (max. 24 p.): 20 pages
Size : 155x70 mm
Artwork Type : BKL 195x70 mm
Specification : EU5038
Printer : EMEA - CCL Label Italy
Packing Location : EMEA - SOLFOTECNICA
COTIGNOLA (F495/F455/IT28-2414)

Ticket No : N/A
Date : 2312
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES
Number of Coulours used : 1



Last updated by : HOP!






PAGE 18

Package MID :	283225 2312
Trade Name :	ZORVEC ENICADE
Country :	ESTONIA, LATVIA, LITHUANIA
Nbre pages (max. 24 p.):	20 pages
Size :	155x70 mm
Artwork Type :	BKL 195x70 mm
Specification :	EU5038
Printer :	EMEA - CCL Label Italy
Packing Location :	EMEA - SOLFOTECNICA COTIGNOLA (F495/F455/IT28- 2414)
Ticket No :	N/A
Date :	2312
Proof Cycle No :	1
COLOUR REFERENCES	
Number of Coulours used :	1
	
Last updated by :	HOP!



	
Package MID :	283225 2312
Trade Name :	ZORVEC ENICADE
Country :	ESTONIA, LATVIA, LITHUANIA
Nbre pages (max. 24 p.):	20 pages
Size :	155x70 mm
Artwork Type :	BKL 195x70 mm
Specification :	EU5038
Printer :	EMEA - CCL Label Italy
Packing Location :	EMEA - SOLFOTECNICA COTIGNOLA (F495/F455/IT28- 2414)
Ticket No :	N/A
Date :	2312
Proof Cycle No :	1
COLOUR REFERENCES	
Number of Coulours used :	1
<div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Noir</div>	
Last updated by :	HOP!

PAGE 19 (REAR COVER)



	
Package MID :	283225 2312
Trade Name :	ZORVEC ENICADE
Country :	ESTONIA, LATVIA, LITHUANIA
Nbre pages (max. 24 p.):	20 pages
Size :	155x70 mm
Artwork Type :	BKL 195x70 mm
Specification :	EU5038
Printer :	EMEA - CCL Label Italy
Packing Location :	EMEA - SOLFOTECNICA COTIGNOLA (F495/F455/IT28- 2414)
Ticket No :	N/A
Date :	2312
Proof Cycle No :	1
COLOUR REFERENCES	
Number of Coulours used :	
Last updated by :	HOP!

PAGE 20 (GLUE PAGE)

