

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts (EC)
Darbīgās vielas: prokvinazīds 50 g/L, protiokonazols 200 g/L

Reģistrācijas Nr.: 0825
Reģistrācijas klase: 2

Uzglabāšana: Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs:

Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Kopenhāgena, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā:
Corteva Agriscience, Tel. +371 2897 5155, www.corteva.lv



276306

2302

**MANDATORY REQUIREMENT:
THIS AREA MUST BE BLANK
(for 2D Data Matrix, Lot Nr.,
Manufacturing Date ...)**



Verben™

FUNGICĪDS


GROUP 13 + 3 FUNGICIDE

UFI: 37RA-R00R-K00S-2NYS

™ ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, ziemas rudzu, speltas kviešu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un vasaras rudzu sējumos

Neto: 5 L



Uzmanību

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instrukciju.

P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/smīdinājumu.

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.

P308+P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību.

P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.

P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.

P501 Atbrīvojies no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smīdināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.



3 362130 199595 >

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūkļā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūkļā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlams ārstu konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saindēšanās informācijas centra tālruna numurs: 67042473

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Strādājot ar preparātu lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, aizsargbrilles, ķīmiski izturīgus cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties novilkt apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI UN IEDARBĪBAS VEIDS

Verben satur divas aktīvās vielas – prokvinazīdu un protiokonazolu, kas ierobežo plaša klāsta graudaugu slimības ziemas un vasaras miežos, ziemas un vasaras kviešos, speltas kviešos, ziemas un vasaras tritikālē un ziemas un vasaras rudzos. Verben ir aizsargājošs sistēmas iedarbības fungicīds ar translaminārām īpašībām plaša klāsta slimību ierobežošanai.

Verben efektivitāte ar devu 0.6 l/ha.

	Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Ziemas mieži, vasaras mieži	Ziemas rudzi, vasaras rudzi	Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle
Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>)	XXX	XX	XX	XX
Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>)	XX			XX
Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	XX		XX	XX
Dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	XX			XX
Miežu pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>)		XX		
Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>)		XX		
Stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)		XX	XX	XX
Kviešu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici –repentis</i>)	XX			XX
Stiebru lūšana (<i>Oculimacula yallundae</i>)	X		XX	XX

XXX- labi ierobežo - efektivitāte > 80%, XX- vidēji ierobežo – efektivitāte 60-80%. X- vāji ierobežo – efektivitāte <60%.

Non-printed area on page 2 ONLY (on the back of «Label A-code + Barcode area»)

Non-printed area on page 2 ONLY (on the back of 2D code area printed on the front page)

Verben efektivitāte ar devu 1.0 l/ha.

	Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Ziemas mieži, vasaras mieži	Ziemas rudzi, vasaras rudzi	Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle
Graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>)	XXX	XX	XXX	XXX
Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>)	XX			XX
Kviešu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici –repentis</i>)	XXX			XXX
Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	XXX		XXX	XXX
Dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	XXX			XXX
Miežu pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>)		XXX		
Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>)		XXX		
Stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)		XXX	XX	XXX
Stiebru lūšana (<i>Oculimacula yallundae</i>)	XX		XX	XX

XXX- labi ierobežo - efektivitāte > 80%, XX- vidēji ierobežo – efektivitāte 60-80%”.

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS

Apstrādājami kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimā-lais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, speltas kvieši	Stiebru lūšana (<i>Oculimacula yallundae</i>)	0.6-1.0	Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32)	35	1
Ziemas kvieši, vasaras kvieši, speltas kvieši	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Zymoseptoria tritici</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltresa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	0.6-1.0	Apsmidzināt sējumus, parādotes slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga cerošanas vidū līdz ziedēšanas vidum (AS 25-65)		

Apstrādājami kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimā-lais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.6-1.0	Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga cerošanas vidū līdz vārpa piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49)	35	1

Apstrādājami kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimā-lais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas tritikāle	Stiebru lūšana (<i>Oculimacula yallundae</i>)	0.6-1.0	Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32)	35	1
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle*	Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Zymoseptoria tritici</i>), brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), stiebrzāļu gredzenoplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	0.6-1.0	Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga cerošanas vidū līdz ziedēšanas vidum (AS 25-65)		

Apstrādājami kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimā-lais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas rudzi	Stiebru lūšana (<i>Oculimacula yallundae</i>)	0.6-1.0	Apsmidzināt sējumus profilaktiski vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32)	35	1
Ziemas rudzi vasaras rudzi*	Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>), stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>), graudzāļu miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	0.6-1.0	Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga cerošanas vidū līdz vārpa piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49)		

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.

Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Mazākās Verben devas var lietot, kad slimību izplatība ir neliela. Nokavēta aprāde samazina produkta efektivitāti.

APSTĀKĻI APSTRĀDES LAIKĀ

Lietot Verben labos augšanas apstākļos. Izvairieties produktu lietot uz stresa novājinātiem augiem. Augu stresu

var radīt tādi apstākļi kā salnas, sausums, pārlieku augsts augsnes piesātinājums ar ūdeni, mikroelementu trūkums un kaitēkļi. Lietojot Verben, nav īpašu norādījumu attiecībā uz temperatūru, tomēr ļoti saulainos apstākļos un gadījumos, kad gaisa temperatūra, pārsniedz 25 °C, ieteicams preparātu lietot no rīta vai vakarā.

AUGSNE

Verben var lietot visos augsnes tipos

LIETUS NOTURĪBA

Verben ir lietus noturīgs jau vienu stundu pēc smidzināšanas.

TVERTNES MAISIJUMI (SAVIENOJAMĪBA)

Verben var tikt izmantots tvertnes maisījumos ar izplatītākajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

PĒCKULTŪRAS

Pēckultūras (normāla augu maiņa) – nav ierobežojumu pēckultūraugu izvēlē.

PĀRSĒJA

Gadījumā, ja kultūraugs jāpārsēj - nav ierobežojumu nākamajiem sētajiem kultūraugiem.

ŪDENS DAUDZUMS

Lietojiet Verben ar ūdens daudzumu 150 līdz 400 litriem uz hektāru. Mazāko ūdens daudzumu lietot tikai gadījumos, kad kultūraugu zelmenis ir neliels. Vēlāk sezonā, kad kultūraugs aug blīvāk, ūdens daudzumu nepieciešams palielināt līdz 200 – 300 litriem uz hektāru.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Tvertni uzpildiet ar tīru ūdeni līdz pusei. Ielejiet smidzinātāja tvertnē nepieciešamo preparāta daudzumu, ieslēdziet maisītāju un uzpildiet pārējo ūdens daudzumu. Turpiniet maisīšanu arī smidzināšanas laikā.

Izmantojot darba šķidrums sagatavošanas tvertni

Lietojot darba šķidrums sagatavošanas tvertni, vispirms piepildiet to līdz pusei ar ūdeni, tad pievienojiet vajadzīgo Verben daudzumu, kurš pēc tam tiek iesūts smidzinātāja tvertnē, kamēr tīrais ūdens tiek pievienots darba šķidrums sagatavošanas tvertnē. Atkārtot procedūru ar apakšējā vārsta atvēršanu/aizvēršanu, kamēr vairs nav redzamas Verben atliekas tvertnē.

SMIDZINĀTĀJA TĪRĪŠANA

Lai novērstu nākošo apstrādājamo kultūraugu, izņemot graudaugus, iespējamos bojājumus, smidzināšanas iekārta pēc lietošanas ir rūpīgi jānomazgā gan no iekšpuses, gan ārpusē.

1. Iztukšojiet smidzinātāju uz lauka pilnībā. Uzreiz pēc smidzināšanas beigām nomazgājiet to no ārpusē.
 2. Izskalojiet smidzinātāja tvertni ar tīru ūdeni un iztukšojiet to, izsmidzinot skalošanas ūdeni caur sprauslām. Skalošanas ūdeni ieteicams izsmidzināt uz tikko apsmidzinātā lauka. Iztukšojiet smidzinātāju pilnībā.
 3. Piepildiet smidzinātāja tvertni ar ūdeni līdz pusei un pievienojiet rekomendēto daudzumu All Clear¹ Extra. Samaisiet un izsmidziniet nelielu daudzumu šķidrums caur sprauslām. Piepildiet tvertni pilnu ar ūdeni un ieslēdziet maisītāju uz 15 minūtēm. Iztukšojiet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā. Iztukšojiet smidzinātāju pilnībā.
 4. Sprauslas un filtri jānoņem un jāizmazgā ar ūdeni, kuram pievienots All Clear Extra 50 ml uz 10 litriem ūdens.
 5. Skalojiet tvertni ar tīru ūdeni. Iztukšojiet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā. Iztukšojiet smidzinātāju pilnībā.
 6. Mazgāšanas un skalošanas ūdeņi jānovirza vietās, kur tie nevar nodarīt kaitējumu apkārtējai videi un nevar nonākt gruntsūdeņos vai virszemes ūdens tilpnēs. Neizsmidzināt uz jutīgiem kultūraugiem vai tīrmos, kur tos paredzēts audzēt.
- Piezīme: Ja tvertni nav iespējams iztukšot pilnībā, 3. punktā minētās darbība ir jāatkārto, pirms veic 4. punktā minētos pasākumus.

SMIDZINĀTĀJU TĪRĪŠANA NO ĀRPUSĒS

Smidzinātāja un traktora tīrīšana ir jāveic vai nu uz apstrādātās platības vai arī jāizmanto speciāls tīrīšanas laukums, kurā ir ierīkots atsevišķs atlikumu savākšanas konteiners. Tīrot smidzinātāju uz lauka, smidzinātājam ir jābūt aprīkotam ar nepieciešamajām mazgāšanas iekārtām, kā arī mazgājamā ūdens daudzumam jābūt pietiekamam.

PRETRESISTENCES STRATĒGIJA

Verben ir kombinēta formulācija ar divām darbīgajām vielām – prokvinazīdu un protiokonazolu. Prokvinazīds ir kvinazolinonu grupas fungicīds, kas pieder azanafalēnu grupai, kuru mērķis ir signālu transdukcija, kas kavē apresorālās sēklotnes, kas parasti kalpo par infekcijas pārnēsātāju augos, attīstību. Fungicīdu pretresistences komiteja (FRAC) ir iedalījusi prokvinazīdu 13. rezistences grupā ar vidēju rezistences attīstības risku. Protiokonazols ir triazolentīna grupas fungicīds. Tas pieder DMI (demetilēšanas inhibitoru) grupai un SBI (sterolu biosintēzes inhibitori) klasei I. To darbības mehānisms novērš inficēšanās procesu, biosintezējot

sterīnu augu membrānās. Fungicīdu pretresistences komiteja (FRAC) ir iedalījusi protiokonazolu 3. rezistences grupā ar vidēju rezistences attīstības risku. Lietojiet Verben saskaņā ar instrukcijām par mērķa organismiem (slimībām) norādītajās attīstības stadijās. Izmantojiet Verben kā daļu no integrētās augu aizsardzības (IAA) stratēģijas, kas ietver citas augu aizsardzības metodes. Apmeklējiet FRAC tīmekļa vietni, lai iegūtu papildu informāciju par graudaugu fungicīdu rezistences pārvaldību.

TUKŠĀ TARA

Iepakojumu pēc iztukšošanas tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes un skalojamo ūdeni izmantot darba šķidrums pagatavošanai. Iepakojumu nedrīkst lietot atkārtoti. Tas jāuzglabā speciāli iekārtotā vietā un to likvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBA

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdensorganismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt sausā un no sala pasargātā vietā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Visi mūsu piegādātie produkti ir augstas kvalitātes un mēs esam pārliecināti par to piemērotību lietošanai, taču, tā kā mēs nevaram nodrošināt kontroli pār uzglabāšanu, transportēšanu, jaukšanu un lietošanu, kā arī par laika apstākļiem pirms apstrādes, apstrādes brīdī un pēc apstrādes, kas var ietekmēt produkta iedarbības efektivitāti, visi nosacījumi un garantijas, likumā noteiktas vai citas, attiecībā uz mūsu produkta kvalitāti vai piemērotību jebkādam tā lietošanai, nav ietverti. Ne mēs, ne mūsu tirdzniecības partneri neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies produkta nepareizas uzglabāšanas, transportēšanas vai lietošanas rezultātā. Šos nosacījumus nevar mainīt ne mūsu darbinieki, ne pārstāvji, neatkarīgi no tā, vai tie pārrauga vai piedalās produktu lietošanā.

¹Registered trademark – FMC Agricultural Solutions

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts (EC)
Darbīgās vielas: prokvinazīds 50 g/L, protiokonazols 200 g/L

Reģistrācijas Nr.: 0825
Reģistrācijas klase: 2
Uzglabāšana: Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs:
Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Kopenhāgena, Dānija
Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā:
Corteva Agriscience, Tel. +371 2897 5155, www.corteva.lv



Verben™

FUNGICĪDS

GROUP	13 + 3	FUNGICIDE
-------	--------	-----------

UFI: 37RA-R00R-K00S-2NYS

™ © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, ziemas rudzu, speltas kviešu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un vasaras rudzu sējumos

Neto: 5 L



Uzmanību

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktažu.
P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/smīdinātāju.
P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P308+P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību.
P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.
P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

