

Lancelot™

No nezālēm brīvi graudaugu sējumi!

Sistēmas iedarbības herbicīds
īsmūža divdīgļlapju nezāļu
ierobežošanai ziemas kviešu,
ziemās miežu, tritikāles, rudzu,
vasaras kviešu, vasaras miežu un
auzu sējumos.

Lancelot™

HERBICĪDS

Lancelot priekšrocības:

- Reģistrēts lietošanai visās graudaugu kultūrās - ziemas kvieši, ziemas mieži, tritilāle, rudzi, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas;
- Lancelot sastāvā ir divas darbīgās vielas no dažādām grupām - florasulams 150 g/kg (ALS inhibitoru grupa) un aminopiralīds 300 g/kg (sintētisko auksīnu grupa), abu darbīgo vielu kombinācija mazina iespējamo rezistences risku;
- Augsta efektivitāte uz tādām izplatītākajām nezāļu sugām kā ķeraīņu madara, kumelītes, zilā rudzupuķe, parastā virza, zīda magone un citas;
- Elastīga lietošanas deva: no 15 līdz 33 g/ha ziemājos un no 10 līdz 33 g/ha vasarājos;
- Optimālā apstrādes temperatūra, sākot ar +8°C, kad nezāles ir mazas un aktīvi augošas;
- Lancelot ir reģistrēts lietošanai no cerošanas sākuma līdz otrā mezglas stadijai (AS 20 - 32);
- Lancelot ir lietus noturīgs jau 1 stundu pēc apstrādes.

Praktiski padomi:

- Lancelot ir disperģējošu granulu formā, labākai produkta efektivitātei ir nepieciešams pievienot bezjonu virsmas aktīvo vielu;
- Visaugstākā produkta efektivitāte tiek sasniegta, kad nezāles ir mazas un aktīvi augošas (2 – 4 lapu stadijā);
- Augstākas efektivitātes nodrošināšanai uz veronikām, vijolītēm, vībotnēm ieteicams lietot Lancelot tvertnes maisījumā ar herbicīdu, kas satur darbīgo vielu metil-tribenurons;
- Pēc Lancelot lietošanas drīkst sēt:
 - tajā pašā rudenī – z.rapsi, z.kviešus, z.miežus, rudzus;
 - pavasarī – v.rapsi, v.kviešus, v.miežus, kukurūzu;
 - 14 mēnešus pēc apstrādes – kartupeļus, burkānus;
 - 24 mēnešus pēc apstrādes – tauriņziežus.


Lancelot efektivitātes tabula:

Nezāles		Lancelot+ Metil- tribenurons 25 g/ha + 15 g/ha + VAV
Parastā vībotne	ARTVU	XXX
Rapsis - sārgaugs	BRSNN - Volounter	XXX
Ganu plikstiņš	CAPBP	XXX
Zilā rudzupuķe	CENCY	XXX
Baltā balanda	CHEAL	XXX
Sējumu krizantēma	CHYSE	XXX
Tīruma usne	CIRAR	XX(X)
Velnarutku grābeklīte	EROCI	XXX
Ārstniecības matuzāle	FUMOF	XXX
Asais aklis	GAETE	XXX
Ķeraīņu madara	GALAP	XXX
Ģerānijas	GEERS	XXX
Sārtā panātre	LAMSS	XXX
Tīruma kumelīte	MATIN	XXX
Tīruma neaizmirstule	MYOAR	XXX
Zīda magone	PAPRH	XXX
Maura sūrene	POLAV	XXX
Dārza vējgriķis	POLCO	XXXX
Parastā krustaine	SENVU	XXX
Tīruma sinepe (zvēre)	SINAR	XXXX
Parastā virza	STEME	XXX
Veronikas	VERSS	XXX
Lauka vijolīte	VIOAR	XXX

XX(X) (70-84.5%)
XXX (85-94.5%)
XXXX (95-100%)



Lancelot efektivitāte, salīdzinot ar kontroli



Aminopiralīda efektivitāte uz tīruma usni



Lancelot efektivitāte, salīdzinot ar kontroli



CORTEVA™
agriscience

TM ® SM Corteva Agriscience un ar to saistīto uzņēmumu preču un pakalpojumu zīmes. © „Corteva“, 2022

Par iespējām iegādāties Lancelot, sazinieties ar Linas Agro tirdzniecības pārstāvjiem.

linas agro

Facebook

Corteva.lv