



Pixxaro™ EC

Arylex™ active

HERBICĪDS

**Spēcīgs risinājums
lietošanai pavasarī,
kas ierobežo plašu
divdīgļlapju nezāļu
spektru.**

Efektīvs risinājums problemātisku divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos. Divu sintētisko auksīnu grupu darbīgo vielu apvienojums vienā herbicīdā. Pixxaro™ EC satur jauno darbīgo vielu Arylex Active un Fluroksipiru, kas nodrošina augstu efektivitāti uz ļoti plašu divdīgļlapju nezāļu spektru, ieskaitot ALS inhibitoru rezistentās sugas.

Pixxaro™ EC priekšrocības:

- Pixxaro™ EC ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas paredzēts īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos pavasarī;
- Elastīgs lietošanas laiks un deva – (AS 23-45) no 0,25 l/ha līdz 0,5 l/ha;
- Nezāles uzņem herbicīdu caur lapām, tāpēc produkts piemērots lietošanai jebkura tipa augsnēs un tam nav ierobežojumu pēckultūras izvēlē;
- Nav nepieciešams pievienot virsmas aktīvo vielu;
- Uz atsevišķu sugu nezālēm redzamas iedarbības pazīmes parādās ļoti ātri pēc apstrādes ar herbicīdu, jau pirmajā diennaktī pēc smidzināšanas;
- Pixxaro™ EC ir augsta efektivitāte uz tādām izplatītākajām divdīgļlapju nezālēm kā ķeraņu madara, zīda magone, sārtā panātre, ārstniecības matuzāle un parastā virza;
- Visspēcīgākais risinājums uz rezistentu parasto virzu;
- Spēcīgs pretrezistences risinājums;
- Drīkst veidot tvertnes maisījumus ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem.



Neapstrādāts



7 dienas
pēc apstrādes



21 diena
pēc apstrādes

Praktiski padomi:

- Optimālā apstrādes temperatūra vismaz +10°C;
- Neapstrādāt sējumus, ja ir bijušas vai gaidāmas nakts salnas;
- Lai palielinātu Pixxaro™ EC efektivitāti pret mazāk jutīgām divdīgļlapju nezālēm, piemēram, kumeli, veroniku sugām un lauka vijolīti, kā arī nodrošinātu augstāku efektivitāti pret pāraugušu rudzupuķi, vībotni un usni, lietojiet tvertnes maisījumā ar metil-tribenuronu saturošu herbicīdu. Šādu preparātu maisījumu var izmantot līdz pat attīstītas karoglapas stadijai graudaugiem (AS 39), kas ļauj brīvi pielāgoties izvēlētajai smidzināšanas programmai;
- Optimālas lietošanas devas:
 - ziemājos 0,33 l/ha Pixxaro™ EC + 20 g/ha Granstar Premia (darbīgā viela metil-tribenurons);
 - vasarājos - 0,25 l/ha Pixxaro™ EC + 15 g/ha Granstar Premia (darbīgā viela metil-tribenurons).

 **CORTEVA™**
agriscience

TM ® SM Corteva Agriscience un ar to saistīto uzņēmumu preču un pakalpojumu zīmes. © „Corteva“, 2022

Par iespējām iegādāties Pixxaro EC,
sazinieties ar Baltic Agro tirdzniecības pārstāvjiem.

Baltic Agro