



EE



LV

LT

Ettevastus**EUH401: Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.**

H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H335: Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

H410: Väga mürgine veeorganismidele, pikajärgeline toime.

P261 : Vältida auru ja pihustatud aine sissehingamist.

P280: Kanda kaitsekindaid, kaitseveest, kaitseprille ja kaitsemaski.

P305+ P351 + P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.

Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

P337 + P313: Kui silmade ärritus ei möödu: pööruda arsti poole.

P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust

MÜRGIJUSTERABEKESKUSE või arstiga.

P403 + P233: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.

P501: Sisumahuhi kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

SP1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede dreenažide).

SPe3: Mittesihhtmärkaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajandusesse mittekasutatavast maast.

Sisaldab ohtlikku ainet: N,N-dimetüül dekaan-1-amiidi ja N,N-dimetüül oktaan amiidi reaktsoonimass.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri**29.11.2011 määruse nr 90 „Taimkaitsevahendite kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning****Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.****HÄDAABI TELEFON: 112. Mürgistusetaabekeskuse number: 16662.****Uzmanību**

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P391 Savākt izšakstīto šķidrumu.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu un pagalmima un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstečām.

SPe3 Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaisītus izdīgušus un neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmatojamai zemei.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefonns 112.**Uzglabāšana.** Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt temperatūrā no 0°C līdz +35°C.**ATSARGIAI**

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Ļaabi toksisks vandens organismams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamo rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko/garu/aerozolio.

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Pasiūtus blogai skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepaeria: kreiptis į gydytoją. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Laikyti laikyti sandariai uždaryta.

Surinkti ištekėjusią medžiagą

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakute (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinčių/vengti taršos per drenąž iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra kloprialido, dažniau kaip kartą per dvejus metus tame pačiame lauke.

Siekiant apsaugoti vandens organismus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinčių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:**8 5 2362052 arba 8 687 533 78.****PRIEŠ NAUDOJIMĄ BŪTINA PERSKAITYTI PRODUKTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!****CORTEVA**
agricience**Korvetto™**

Arylex™ active

HERBITSIID/HERBICĪDS/HERBICIDAS

™ Trademarks of Corteva, DuPont, Dow AgroSciences and Pioneer and affiliated companies or their respective owners.

EE

LV

LT

Korvetto on selektiivne tārkamisjārgne herbicīds, mis on mēdļud kasutamiseks hērkīde taliraps sortidega.

Toodeit vōib osta ja kasutada ainult taimkaitsetunnistust omav isik.**Toimeained:** metūūlahalauksifeen 5 g/l ja klopīralīd 120 g/l**Preparatīv vorm:** emulsiioinikonsentraat**Eesti reg. nr.:** 748/04.02.19**Valmistamise aeg:** vaata pakendil**Partii nr.:** vaata pakendil**Sāilivusaeg:** 2 aastat**Tootja/pakendaja:** Dow AgroSciences SA**Registreeimise haldaja:**

Corteva Agriscience Denmark A/S,

Langebrogade 1, DK-1411

Kopenhāgeni K, Taani.

Tel: +45 45 28 08 00

Selektiivs sistēmas iedarbības herbicīds ismūža un dažu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša sējumos.

Darbīgās vielas: metil-halauksifēns 5 g/l, klopīralīd 120 g/l**Preparatīv forma:** emulsiijas koncentrāts**Reģistrācijas Nr.:** 0663**Reģistrācijas klase:** 2**Partijas numurs/izgatavošanas datums:** skatīt uz iepakojuma.**Derīguma termiņš:** 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērta oriģinālā iepakojumā.**Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs:**

Corteva Agriscience Denmark A/S,

Langebrogade 1, DK-1411

Kopenhāgena K, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā:

Corteva Agriscience, Tālr.:

+371 2897 5155, www.corteva.lv

Korvetto yra selektyvus herbicidas, skirtas sudygsiui dviskilčių piktžolių naikinimui pavasarį žieminių rapsų pasėliuose.

Preparatas skirtas profesionalajam naudojimui.**Veikliosios medžiagos:**

haloksifen-metilas 5 g/l (0,51 %),

klopīralīd 120 g/l (12,21 %)

Preparato forma: koncentruota emulsija**Reģistrācijas Nr.:** AS2-51H(2020)**Siuntos Nr.:** žiūrėti ant pakuotės.**Pagamino data:** žiūrėti ant pakuotės.**Gallojimo laikas:** 2 metai.**Preparatą registravo:**

Corteva Agriscience Denmark A/S,

Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhāga K,

Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S atstovas Lietuvoje: Corteva

Agriscience Lithuania UAB, Spaces

Gedimino pr 44A, LT-01110, Lietuva.

Tel. +370 5 2100260, www.corteva.lt**NETOKOGUS/NETO/GRYNASIS KIEKIS: 3 L**

0970331982012

**Lietošanas instrukcija latviski seko pēc teksta igauņu valodā.
Naudojimo instrukcija lietuviškai pateikiama po estišku ir latvišku tekstu.**



Keskkonnaohhtikkus

Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Keskkonnaasaaste vältimiseks hoida toodet originaalpakendis.

Taara purunemisel

Mahaläinud vedel preparaati katta liiva, saepuru või absorbendiga kuni preparaati on täielikult segunenud. Juhul, kui preparaati pole võimalik teistmoodi ohustada, tuleb saastunud ala eraldada ja mullale sattunud aine eemaldada. Saastunud pinnasekiht tuleb töödelada absorbeeriva ainega, maha koorida, koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Kasutamiseõpetus

Korvetto on selektiivne tarkamisjärgne herbitsiid, mis on mõeldud kasutamiseks kõikide talirapsi sortidega.

Korvetto on lehekaudse mõjuga herbitsiid mitmete üheaastaste laialeheliste umbrohtude vastu, sealhulgas rukkilill (*Cyanus segetum*), valge hanemalts (*Chenopodium album*), põldohakas (*Cirsium arvensis*), roomav madar ehk virm (*Galium aparine*), hariilik kesalill (*Tripleurospermum inodorum*), kukemagun (*Papaver rhoeas*), verev iminõges (*Lamium purpureum*), hariilik punand (*Fumaria officinalis*) ja kurerehad (*Geranium spp.*).

Toimeviis

Korvetto sisaldab kahte toimeainet: metüülhalaüksifeeni ja klopüraliidi. Mõlemad kuuluvad sünteetiliste auksiinide herbitsiidide rühma ja imenduvad peamiselt läbi umbrohtude lehestiku. Visuaalsed tunnused avalduvad tundlikel liikidel tavaliselt mõni päev pärast kasutust. Lõplik mõju avaldub 4-6 nädalat pärast kasutust.

Ilmastikutingimused pritsimise ajal

Parima tulemuse saavutamiseks kasutatakse Korvetto't umbrohtude noorte taimede varajases kasvufaasis. Jüuline konkurentsi kultuuri poolt tõhustab raskesti kontrollitavate umbrohtude tõrje efektiivsust.

Korvetto kasutamise optimaalne temperatuur on siis kui päevane temperatuur on alates 10°C. Mitme umbrohu tõrjel nagu kukemagun, valge hanemalts, roomav madar ehk virm, verev iminõges ja hariilik punand saavutatakse parem tulemus madalamal temperatuuril. Ärge pritsige põllukultuure Korvetto'ga, kui on oodata öökülma.

Ärge pritsige põllukultuure, mis on stressi all. Stress võib olla põhjustatud paljudest teguritest, sealhulgas öökülm, põud, liigniiskus, mikroelementide puudus, haigused ja kahjuritest. Korvetto võib mõnikord põhjustada kerge ja mööduva (2-3 nädalat) põllukultuuride kasvu pidurdumise. See ei mõjuta saaki ega põllukultuuride kvaliteeti.

Kulunorm ja pritsimise ajastamine

Kultuur	Kasvu-faas	Kulu-norm	Visuaalne kontroll		
			95-100%	85-94,9%	
Taliraps	BBCH 30-50	1,0 l/ha	Rukkilill (<i>Cyanus segetum</i>); valge hanemalts (<i>Chenopodium album</i>); roomav madar ehk virm (<i>Galium aparine</i>); hõimlehine iminõges (<i>Lamium amplexicaule</i>), verev iminõges (<i>Lamium purpureum</i>), põldmagun (<i>Papaver dubium</i>)	Valge karikakar (<i>Anthemis arvensis</i>), põldohakas (<i>Cirsium arvense</i>), hariilik punand (<i>Fumaria officinalis</i>), lõhislehine kurereha (<i>Geranium dissectum</i>), madal kurereha (<i>Geranium pusillum</i>), hariilik kesalill (<i>Tripleurospermum inodorum</i>), kukemagun (<i>Papaver rhoeas</i>), hariilik ristirohi (<i>Senecio vulgaris</i>), ümaralehine kurereha (<i>Geranium rotundifolium</i>), teekummel (<i>Matricaria chamomilla</i>)	Rihu-peenlook (<i>Descurainia sophia</i>), pehme kurereha (<i>Geranium molle</i>)

1 kasutuskord hooaja jooksul.

Muld

Korvetto't võib kasutada kõikidel mullatüüpidel.

Vihmakindlus

Korvetto on vihmakindel ühe tunni jooksul pärast pritsimist.

Ettevaatusabinõud

Klopüraliidi jääkidega taimne materjal võib järgnevald tundlikke põllukultuure kahjustada, kui nendeks on kartul, herned ja oad. Seetõttu ärge kasvatage tundlikke põllukultuure kohe pärast Korvetto'ga töödeldud põllukultuuri. Korvetto'ga töödeldud põllukultuuri taimset materjali ei tohi kasutada kasvuhoonetes või kompostis. Pärast Korvetto'ga pritsimist veenduge, et pihustusseadmed on põhjalikult puhastatud. Eriti tähelepanelik tuleb olla, kui järgmisena pritsitakse tundlikke kultuure.

Järgnevad kultuurid

Tavalise külvikorra puhul pärast talirapsi pritsimist Korvetto'ga võib kasvatada kõiki kultuure.

Ümberkülv

Juhul, kui kevadel on vajadus ümberkülviks pärast Korvetto'ga töötlemist, võib külvata teravilja, kõrrelisi heintaimi, rapsi ja maisi.

Mõju lähedalasuvatele kultuuridele

Sojauba, põldubja ja päevalill on tundlikud kultuurid. Pritsimisel hoida vahet minimaalset 3 m ja kasutada triivi vähendavaid otsikuid.

Pritsimisvõtted ja vee hulk

Herbitsiidi Korvetto saab kasutada traktori külge kinnitatud taimekaitsepritsiga. Toodet saab lisada paagi pealt või sisselasketoru kaudu. Soovitav pritsimiskogus on 100–300 liitrit vett hektari kohta. Kasutage töödeldava umbrohu lehe arengule ja vilja tihedusele vastavat otsikut ja pritsimistehnikat. Minimaalne soovitatav pritsimiskogus on 200 liitrit vett hektari kohta.

Pritsimislahuse valmistamine

Enne preparaadi kasutamist veenduge alati, et prits on korralikult puhastatud ning seal ei ole settejääke. See on eriti oluline, kui pritsi on kasutatud teistel kultuuridel.

Täitmiseseadme kasutamine:

Kasutades Korvetto't, täitke täitmiseseadme paak poolenisti veega, seejärel lisage soovitud kogus preparaati. Segu imeda pitsipaaki, ning samal ajal lisada paaki ülejäänud kogus puhast vett. Seejärel loputage täiteseade ning tühjad anumad, kui neid on. Korra alumise ventilli avamise ja sulgemise protseduuri seni, kuni täiteseadmes ei ole silmaga nähtavaid jälgi Korvetto'st.

Vahetu sisseemine:

Kui te kasutate vahetu sisseemise seadet, juhtige lahjendamata toode otse torudesse, mis lähevad pitsipaagist pihustiteni.

Kui lülitate seadme välja või lõpetate pritsimise, tuleb läbi viia süsteemi läbipesu ja puhastamine. Loputusvesi pritsitakse sõites töödeldud alale.

Paagi puhastamine

Pese korralikult veega kõik pritsimis- ja mõõtevarustus kohe peale kasutamist.

Vältimaks hilisemaid pritselahjustusi, tuleb kogu pritsimistehnika pesta seest ja väljastpoolt alljärgnevalt:

1. Peale pritsimist tühjendage prits kohe. Oluline on pritsi pesemine puhta veega ka väljastpoolt.
2. Loputa pitsipaaki puhta veega ja loputa läbi ka pritsipoom ning pihustid vähemalt pitsipaagi 1/10 koguse veega. Tühjenda paak korralikult.
3. Täitke prits puhta veega ja lisage puhastusvahendit soovitatav kogus. Sega pritsis olevat segu ning seejärel loputage prits poomi ja voolikute kaudu. Täida paak täielikult veega ja laske veel tsirkuleerida 15 minuti vältel. Tühjendage täielikult prits poomi ja voolikute kaudu.
4. Pihustid ja filtrid tuleb eemaldada ning puhastada eraldi puhastusvahendi lahusega.
5. Loputa tank puhta veega ning pihusta läbi poomi ja pihustite vähemalt 1/10 vett pitsipaagi mahutatavusest. Tühjenda paak lõplikult.
6. Pesuvee pritsida töödeldud alale. Ära pritsi tundlikule kultuurile või põllule, kuhu külvatakse tundlik kultuur.

Märkus: kui ei ole võimalik pritsi täielikult tühjendada, siis tuleb enne 4. töökäigu juurde minekut korrata 3. töökäiku.

Pritsi väline puhastamine

Pritsi ja traktori puhastamine peab toimuma samal põllul, mida töödeldi või selleks ettenähtud alal, kus on pesuvee kogumise võimalus paakidesse või muudesse anumatesse. Kui te puhastate pritsi äsja töödeldud põllul, on oluline, et prits oleks varustatud vajaliku seadmega ning et olemas oleks vajalik kogus vett.

Resistentsus

Toode	Tüüp	Toimeaine	HRAC-grupp	Resistentsuse tekkerisk
Korvetto	HERBITSIID	Klopüraliid	O	Madal
		Metüülhalauksifeen	O	Madal

Korvetto sisaldab kahte toimeainet: metüülhalauksifeeni ja klopüraliidi. Mõlemad toimeained kuuluvad HRACi klassifikatsiooni järgi O-gruppi. Resistentsuse tekkeriski O-grupi herbitsiididele peetakse madalaks.

Hoiutingimused

Hoida ainult originaalpakendis, varustatuna etiketiga, tihedalt suletuna, ohutus, jahedas, kuivas ja lukustatud kohas mitte alla 0°C ja üle +30°C. Hoida otse päikesekiirguse ja soojusallika eest, vältida preparaadi külmumist. Säilitada suletuna ning lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toidust, joogist ja loomasöödad. Hoiukoha täpsemad nõuded on välja toodud Põllumajandusministri 29.11.2011 määruses nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“.

Taara kahjutustamine

Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitsevahendi paaki või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele. Mahavalgunud preparaat koguda kokku absorbeeriva ainega spetsiaalsesse vastavalt markeeritud anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Tähelepanu!

Kõik tootja poolt tamitavad tooted on kõrge kvaliteediga ning tootja on kindel nende sobivuses, kuid kuna tootjal puudub kontroll nende säilitamise, käsitsemise, segamise või kasutamise üle ning enne või pärast pihustamist või selle ajal valitsevate ilmastikutingimuste üle, ei rakendu neile seadusandlusest tulenevad või muud kinnitused, tingimused või tagatised, mis puudutavad toodete rahuldavat kvaliteeti, sobivust eesmärgiks. Toote säilitamisest, käsitsemisest, rakendamisest või kasutamisest tingitud ebatulemuslikkus, kahju või vigastus ei kuulu tootja ega edasimüüjate vastutusalasse. Töötajad ega agendid ei ole volitatud neid tingimusi muutma, sõltumata sellest, kas nad on nende toodete kasutamise järelvaatamise või abistamise kaudu seotud.

™ Trademarks of Corteva, DuPont, Dow AgroSciences and Pioneer and affiliated companies or their respective owners.

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūkļā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūkļā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saindēšanās informācijas centra tālruna numurs: 67042473

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēkēt, darbojoties ar vielu. Strādājot ar preparātu lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, aizsargbrilles, ķīmiski izturīgus cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties novilkt apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

PREPARĀTS UN TĀ IEDARBĪBAS VEIDS

Korvetto ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša sējumos.

Korvetto satur divas darbīgās vielas – metil-halauksifenu un klopīralīdu. Abas darbīgās vielas pieder pie sintētisko auksīnu grupas un galvenokārt tiek uzņemtas augā caur lapām. Herbicīda iedarbības vizuālās pazīmes ir redzamas jau dažas dienas pēc apstrādes, bet pilns iedarbības efekts ir redzams aptuveni pēc 4-6 nedēļām.

Korvetto efektivitāte nezāļu ierobežošanā, deva 1.0 l/ha.

	Nezāles
Ļoti laba, (efektivitāte >95%)	Parastā rudzupuķe (<i>Centaurea cyanus</i>), ķeraīņu madara (<i>Galium aparine</i>), sārtā panātre (<i>Lamium purpureum</i>), skaujošā panātre (<i>Lamium amplexicaule</i>), lauka magone (<i>Papaver dubium</i>)
Laba, (efektivitāte 85 līdz 94.9%)	<i>Tiruma pavirza</i> (<i>Anagallis arvensis</i>), ārstniecības matuzāle (<i>Fumaria officinalis</i>), tīruma kumelīte (<i>Matricaria inodora</i>), krustaine parastā (<i>Senecio vulgaris</i>), apallapu gandrene (<i>Geranium rotundifolium</i>), sīkā gandrene (<i>Geranium pusillum</i>), šķeltā gandrene (<i>Geranium dissectum</i>), ārstniecības kumelīte (<i>Matricaria recutita</i>), zīda magone (<i>Papaver rhoeas</i>)
Vidēja, (efektivitāte 70 līdz 84.9%)	Mīkstā gandrene (<i>Geranium molle</i>), sofijas smalkžodzene (<i>Descurainia sophia</i>)

Lietošanas laiks un deva

Apstrādājami kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas rapsis	Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	1.0	Apsmidzināt sējumus pavasarī atjaunojoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stublāja pagarināšanos līdz ziedpumpuru veidošanās sākumam (AS 30-50)	-	1

Piezīme.

Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmatojamai zemei.

LAIKA APSTĀKĻI APSTRĀDEI

Korvetto piemērotākais lietošanas laiks ir, kad nezāles ir agrīnā attīstība stadijā un ir aktīvi augošas. Spēcīgi augošs rapsis veicinās grūtāk ierobežojamo nezāļu sugu ierobežošanu.

Optimālais Korvetto lietošanas laiks ir kad temperatūras ir virs +10° C. Dažas nezāļu sugas, kā magones, ķeraīņu madara, sārtā panātre un ārstniecības matuzāle, tiks sekmīgi ierobežotas arī zemākās temperatūrās. Apstrādi neveikt, ja iespējamas nakts salnas. Neapstrādājiet sējumos, kad kultūraugs atrodas stresa apstākļos. Stresa apstākļos var radīt daudzi faktori, tai skaitā sals, sausums, pārmērīgs mitrums, minerālvietu trūkums, slimības, kaitēkļi u.tml. Korvetto dažreiz var izraisīt nelielu un pārejošu kultūrauga augšanas palēnināšanos 2-3 nedēļas pēc apstrādes, bet tas neatstāj negatīvu ietekmi uz ražu.

AUGSNE

Korvetto var lietot visu tipu augsnēs.

LIETUS NOTURĪBA

Korvetto ir lietus noturīgs jau vienu stundu pēc izsmidzināšanas.

PĒCKULTŪRAS

Pēc Korvetto lietošanas ziemas rapsī nav nekādu ierobežojumu pēckultūras izvēlei.

PĀRSĒJA

Ja ar Korvetto apstrādāts rapsis ir jāpārsēj, var sēt graudaugus, stiebrzāles, rapsi vai kukurūzu.

UZMANĪBU

Nesadalījūs ar Korvetto apstrādātu augu pēcplaujas atliekas var kaitēt jutīgiem kultūraugiem, kā kartupeļi, zirņi un lauka pupas, tāpēc nerekomendējam sēt vai stādīt pret Korvetto jutīgus kultūraugus uzreiz pēc augu atlieku iestrādes augsnē. Ar Korvetto apstrādātu augu atliekas neizmantojot siltumnīcās un kompostam.

Pēc Korvetto lietošanas, pārliecinieties, ka smidzināšanas iekārta ir rūpīgi izmazgāta, pirms uzsāciet jutīgu kultūraugu apstrādi.

SMIDZINĀŠANAS TEHNIKA UN ŪDENS DAUDZUMS

Korveta izmidzināšanai var izmantot jebkura tipa smidzinātājus, kas ir kalibrēti un sagatavoti darbam saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Rekomendējama darba šķidrums patēriņš uz vienu hektāru ir 100-300 litri.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms smidzināšanas šķidruma sagatavošanas vienmēr pārliecinieties, ka smidzinātājs ir akurāti iztīrīts un bez aplikuma. Tas ir īpaši svarīgi, ja pirms tam ir apsmidzināti citi kultūraugi.

Izmantojot darba šķidruma sagatavošanas tvertni

Lietojot darba šķidruma sagatavošanas tvertni, vispirms piepildiet to līdz pusei ar ūdeni, tad pievienojiet vajadzīgo Korvetto daudzumu, kurš pēc tam tiek iesūts smidzinātāja tvertnē, kamēr tīrais ūdens tiek pievienots darba šķidruma sagatavošanas tvertnē. Pēc tam izskalojiet darba šķidruma sagatavošanas tvertni un tukšās kannas. Atkārtot procedūru ar apakšējā vārsta atvēršanu/aizvēršanu, kamēr vairs nav redzamas Korvetto atliekas tvertnē.

SMIDZINĀTĀJU TĪRĪŠANA

Smidzināšanas maisījumu atlikumiem un skalojamajam ūdenim ir jābūt izsmidzinātām uz lauka vai īpašā skalošanas vietā neatkarīgi no smidzinātāju uzpildīšanas specifikas. Skalošanas tvertnes ūdens atlikumam jābūt tādām, lai atliktu smidzināšanas šķidrums varētu atšķaidīt vismaz 50 reizes. Izskalojiet smidzinātāja tvertni nekavējoties pēc skalojamā ūdens iepildīšanas, izmantojot smidzinātāja tvertnes skalojamās sprauslas. Tvertnes skalošanas ūdens var tikt sadalīts tā, lai atsevišķu skalošanu un izsmidzināšanu varētu veikt 2-3 reizes. Tvertnes skalošanas šķidrums izsmidzina šķērsojot apstrādāto lauku.

SMIDZINĀTĀJU TĪRĪŠANA NO ĀRPUSES

Smidzinātāja un traktora tīrīšana ir jāveic vai nu uz apstrādātās platības vai arī jāizmanto speciāls tīrīšanas laukums, kurā ir ierīkots atsevišķs atlikumu savākšanas konteiners. Tīrot smidzinātāju uz lauka, smidzinātājam ir jābūt aprīkotam ar nepieciešamajām mazgāšanas iekārtām, kā arī mazgājamā ūdens daudzumam jābūt pietiekamam.

PRETRESISTENCES STRATĒGIJA

Produkta nosaukums	Lietošanas kategorija	Darbīgās vielas	HRAC grupa	Rezistences izveidošanās risks
Korvetto	herbicīds	klopiralīds	O	zems
		metil-halauksifens	O	zems

Korvetto satur divas darbīgās vielas – metil-halauksifenu un klopiralīdu. Abas darbīgās vielas pieder pie O grupas pēc HRAC (Herbicide Resistance Action Committee - Herbicīdu Rezistences Darbības Komiteja) klasifikācijas. Rezistences izveidošanās risks pret O grupas darbīgajām vielām ir zems.

VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA

Virsmas aktīvās vielas pievienošana darba šķidrums nav nepieciešama.

TUKŠĀ TARA

Pēc iztukšošanas iepakojumu nekavējoties izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes un skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmatot darba šķidrums pagatavošanai. Iepakojumu nedrīkst lietot atkārtoti. Tas jāuzglabā speciāli iekārtotā vietā un to likvidē ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt sausā un no sala pasargātā vietā. Uzglabāt temperatūrā no 0°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

VIDES AIZSARDZĪBA

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Visi mūsu piegādātie produkti ir augstas kvalitātes un mēs esam pārliecināti par to piemērotību lietošanai, taču tā kā mēs nevaram nodrošināt kontroli pār uzglabāšanu, transportēšanu, jaukšanu un lietošanu, kā arī par laika apstākļiem pirms apstrādes, apstrādes brīdi un pēc apstrādes, kas var ietekmēt produkta iedarbības efektivitāti, visi nosacījumi un garantijas, likumā noteiktās vai citas, attiecībā uz mūsu produkta kvalitāti vai piemērotību jebkādai tā lietošanai, nav ietverti. Ne mēs, ne mūsu tirdzniecības partneri neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies produkta nepareizas uzglabāšanas, transportēšanas vai lietošanas rezultātā. Šos nosacījumus nevar mainīt ne mūsu darbinieki, ne pārstāvji, neatkarīgi no tā, vai tie pārrauga vai piedalās produktu lietošanā.

Reģistrācijas īpašnieki un ražotājs:

Corteva Agriscience Denmark A/S Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhāgena K, Dānija

™ Trademarks of Corteva, DuPont, Dow AgroSciences and Pioneer and affiliated companies or their respective owners.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Korvetto yra selektyvus herbicidas, skirtas sudygusių dviskilčių piktžolių naikinimui pavasarį žieminių rapsų pasėliuose. Produktas tinkamas naudoti visose žieminių rapsų veislėse.

Herbicidas naikina daugelį dviskilčių piktžolių, tokias kaip rugiagėles, baltąsias balandas, dirvines usnis, kibiuosius lipikus, bekvapius šunramunius, aguonas birules, raudonžiedes notreles, vaistines žvirbliarūtes ir snapučius.

VEIKIMO BŪDAS

Korvetto sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos: haloksifen-metilas ir klopiralidas. Abi veikliosios medžiagos priklauso sintetinių auksinių grupei ir į piktžoles patenka per lapus. Poveikis jautrioms piktžolėms bus pastebimas jau po kelių dienų. Jų augimas sustoja, o piktžolės visiškai žūsta per 4 – 6 savaites po purškimo.

NORMOS IR PURŠKIMO REKOMENDACIJOS

Augalai: žieminiai rapsai

Purškimo laikas: pavasarį, nuo stiebo ilgėjimo pradžios iki butonai apgaubti lapais (BBCH 30-50)

Norma: 1,0 l/ha

Veiksmingumas	Piktžolės
Labai jautrios piktžolės (veiksmingumas 95–100%)	Rugiagėlė (<i>Cyanus segetum</i>), baltoji balanda (<i>Chenopodium album</i>), kibisius lipikas (<i>Galium aparine</i>), apskritalapė notrelė (<i>Lamium amplexicaule</i>), raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>), dirvinė aguona (<i>Papaver dubium</i>)
Jautrios piktžolės (veiksmingumas 85–94,9%)	Dirvinis bobramunis (<i>Anthemis arvensis</i>), dirvinė usnis (<i>Cirsium arvense</i>), vaistinė žvirbliarūtė (<i>Fumaria officinalis</i>), snapučiai (<i>Geranium sp.</i>), bekvapis šunramunis (<i>Tripleurospermum inodorum</i>), vaistinė ramunė (<i>Matricaria chamomilla</i>), aguona birulė (<i>Papaver rhoeas</i>), paprastoji žilė (<i>Senecio vulgaris</i>)
Vidutiniškai jautrios piktžolės (veiksmingumas 70–84,9%)	Paprastasis pokilius (<i>Descurainia sophia</i>), švelnusis snaputis (<i>Geranium molle</i>)

DĖMESIO!

Ypatingai saugokitė, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių žemės ūkio augalų.

ORO SĄLYGOS PURŠKIMO METU

Optimalus Korvetto efektyvumas pasiekiamas purškiant mažas piktžoles ankstyvuose jų augimo tarpsniuose.

Geriausios sąlygos purškimui, kai dienos temperatūra yra +10 °C. Kai kurios piktžolės, tokios kaip aguona birulė, baltoji balanda, kibisius lipikas, raudonžiedė notrelė ir vaistinė žvirbliarūtė bus efektyviai sunaikintos esant ir žemesnei oro temperatūrai.

Nepurškite, jei prieš ar po purškimo prognozuojamos šalnos.

Nepurškite stresą patyrusių augalų. Augalai stresą gali patirti dėl daugelio priežasčių: šalčio, šalnos, sausros, užmirškimo, maisto medžiagų trūkumo, ligų ir kenkėjo antpuolio. Korvetto kartais gali sukelti nežymų ir trumpalaikį (2-3 savaitės) augimo sulėtėjimą, kuris neturi jokios įtakos tolimesniam rapsų augimui, derliui ir jo kokybei.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

DIRVA

Korvetto gali būti naudojamas žeminiuose rapsuose, auginamuose visuose dirvožemiuose.

PURŠKIMO TECHNIKA IR VANDENS KIEKIS

Korvetto turi būti išpurškamas tvarkingais ir pagal gamintojo reikalavimus kalibruotais traktoriniais hidrauliniiais lauko purkštuvais.

Įrenginys gali turėti išmaišymo indą ar tiesioginio įpurškimo sistemą.

Rekomenduojamas vandens kiekis yra 150–300 litrų vienam hektarui. Mažiausias vandens kiekis turėtų būti purškiamas, jei pasėlis retas ir piktžolės mažos. Naudokite pasėlių tankumui ir naikinamų piktžolių lapų padėčiai pritaikytus antgalius ir purškimo techniką. Tankiuose pasėliuose rekomenduojama purkšti ne mažiau nei 200 litrų vandens hektarui.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Prieš dedant ruošti tirpalą, būtina įsitikinti, kad purkštuvus yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiems augalams purkšti.

Kai naudojamas išmaišymo indas, pusė purkštuvo talpos užpildoma vandeniu. Tuomet į išmaišymo indą supilamas reikiamas Korvetto kiekis, kuris nusiurbiamas į purkštuvo talpą. Į purkštuvo talpą supilamas trūkstamas vandens svaraš vandens. Vėliau išmaišymo indas turi būti gerai išskalaujamas. Skalavimo procedūrą kartoti tol, kol jame nebesimato Korvetto likučių.

Kai naudojamas tiesioginio įpurškimo įrenginys, neskiestas produktas automatiškai tiekiamas į vamzdžius, jungiančius purkštuvo talpą su purkštukais. Kai purkštuvus išjungiamas ar baigiamas purškimas, turi būti atliekamas vamzdinių praplovimas.

PURKŠTUVO VIDAUS PLOVIMAS

Siekiant išvengti žalos vėliau purškiamiems žemės ūkio augalams, iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvo talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 3 kartus vidiniais purkštukais išplaukite purkštuvo vidų švari vandeniu. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įplikite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Vandenį išleiskite pro vamzdžius. Plovimui naudotą tirpalą išpurškite ant apdorotų rapsų plotų.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Purkštuvus ir traktorius plaunami tame pačiame lauke, kur buvo purškiamas tirpalas. Tokiu atveju purkštuvus turi turėti tam skirtą įrangą bei pakankamą svaraš vandens talpą. Purkštuvą galima plauti ir specialioje tam skirtoje purkštuvų plovimo aikštelėje, turinčioje paplavų surinkimo talpą.

KITAIŠ METAIS AUGINAMI ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI

Įprastai nuėmus Korvetto purkštų žieminių rapsų derlių, galima sėti visus augalus be apribojimų.

ATSĖJIMAS

Jei dėl kokių nors priežasčių sunyko Korvetto purkšti žieminiai rapsai, galima atsėti javais, varpinėmis žolėmis, rapsais arba kukurūzais.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Augalų liekanos, kuriose yra kloprialido, gali pakenkti vėliau sėjamiems/sodinamiems jautriems augalams, tokiems kaip bulvės, žirniai ir pupos. Nerekenduojama sėti/sodinti jautrių augalų iš karto po rapsų, kurie buvo purškti Korvetto. Augalų liekanos, apdorotos Korvetto, neturėtų būti naudojamos šiltnamiuose ar komposto ruošimui.

Lietus praėjus 1 val. po purškimo poveikio Korvetto veiksmingumui neturi.

ATSPARUMO STRATEGIJA

Produktas	Tipas	Veikliosios medžiagos	HRAC grupė	Atsparumo išsivystymo atsiradimo rizika
Korvetto	Herbicidas	Kloprialidas	O	žema
		haloksifen-metilas	O	žema

Korvetto sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos: haloksifen-metilas ir kloprialidas. Pagal veikimo būdą abi veikliosios medžiagos yra sintetiniai auksiniai (HRAC kodas – O). Atsparumo išsivystymo rizika O grupės herbicidams vertinama kaip žema. Nepaisant to, Korvetto naudokite griežtai laikydamiesi etiketės rekomendacijų. Nemažinkite normos, purškite aktyviai augančias, ankstyvuose augimo tarpsniuose esančias piktžoles. Tuomet jos yra jautriausios herbicidui.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvu priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374). Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166).

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvu priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos.

Darbuotojams eiti į herbicidu apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgus kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SAUGOJIMAS

Preparatą laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje toliau nuo aukštos temperatūros šaltinio.

Laikyti tik originalioje pakuotėje, temperatūra laikymo metu turi būti 0°C - +30°C.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

PASTABA

Visi mūsų tiekiami produktai yra labai aukštos kokybės. Tačiau gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, jei produktas buvo netinkamai saugotas, maišomas, ar oro sąlygos prieš, po ar produkto naudojimo metu nepalankios purškimui.

TMTrademarks of Corteva, DuPont, Dow AgroSciences and Pioneer and affiliated companies or their respective owners.

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**



EE

Ettevaatust
EUH401: Inimeste tervise ja keskkonna ohutamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H335: Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
H410: Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
P261 : Vältida auru ja pihustatud aine sissehingamist.
P280: Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.
P305+ P351 + P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord P337 + P313: Kui silmade ärritus ei möödu: pööruda arsti poole.

P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGIISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P403 + P233: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.

P501: Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

SP1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida sadestamist läbi lauda ja teede drenaažide).

SPe3: Mittesilmsmärkatimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.

Sisaldab ohtlikku ainet: N,N-dimetüül dekaan-1-amiid ja N,N-dimetüül oktaan amiidid reaktsoonimass.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimkaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

HÄDAABI TELEFON: 112. Mürgistusteabekeskuse number: 16662.



LV

Uzmanību

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
EUH401 Loti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H410 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACIEM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
P391 Savākt izsīkstiņus šķidrumu.
P501 Atbrīvoties no satura/vertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpij un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstečēm.

SPe3 Lai aizsargātu izdzīgušus un neizdzīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdzīgušus un neizdzīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmotājamai zemei.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana. Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt temperatūrā no 0°C līdz +35°C.

LT

ATSARGIAI

Sukelia smarkų akių dirginimą.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakilimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerolio.
Naudoti akių (veido) apsaugos priemonės.
Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Surinkti ištekėjusią medžiagą
Talpyklą šalinti pagal nacionalines teisės akty reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakute (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenazą iš sodų ar nu o kelius).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra kloprialid, dažniau kaip kartą per dvejus metus tame pačiame lauke.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinio ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ BŪTINA PERSKAITYTI PRODUKTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!



Korvetto™

Arylex™ active

HERBITSIID/HERBICĪDS/HERBICIDAS

™ Trademarks of Corteva, DuPont, Dow AgroSciences and Pioneer and affiliated companies or their respective owners.

EE

Korvetto on selektiivne tärkamisjärgne herbitsiid, mis on mõeldud kasutamiseks kõikide talirapsi sortidega.

Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Toimeained: metüülhalaüksifeen 5 g/l ja kloprialiid 120 g/l

Preparaadi vorm: emulsioonikonsentraat

Eesti reg. nr.: 748/04.02.19

Valmistamise aeg: vaata pakendil

Partii nr.: vaata pakendil

Säilivusaeg: 2 aastat

Tootja/pakendaja: Dow AgroSciences SA

Registreerimise haldaja: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Taani.
Tel: +45 45 28 08 00

Registreerimise haldaja: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Taani.
Tel: +45 45 28 08 00

Registreerimise haldaja: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Taani.
Tel: +45 45 28 08 00

Registreerimise haldaja: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Taani.
Tel: +45 45 28 08 00

Registreerimise haldaja: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Taani.
Tel: +45 45 28 08 00

Registreerimise haldaja: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Taani.
Tel: +45 45 28 08 00

LV

Selektiivs sistēmas iedarbības herbicīds iemūza un dažu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša sējumos.

Darbīgās vielas: metil-halauksifēns 5 g/l, kloprialīds 120 g/l

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Reģistrācijas Nr.: 0663

Reģistrācijas klase: 2

Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērta oriģinālā iepakojumā.

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā: Corteva Agriscience, Tālr.: +371 2897 5155, www.corteva.lv

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā: Corteva Agriscience, Tālr.: +371 2897 5155, www.corteva.lv

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā: Corteva Agriscience, Tālr.: +371 2897 5155, www.corteva.lv

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā: Corteva Agriscience, Tālr.: +371 2897 5155, www.corteva.lv

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā: Corteva Agriscience, Tālr.: +371 2897 5155, www.corteva.lv

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā: Corteva Agriscience, Tālr.: +371 2897 5155, www.corteva.lv

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā: Corteva Agriscience, Tālr.: +371 2897 5155, www.corteva.lv

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā: Corteva Agriscience, Tālr.: +371 2897 5155, www.corteva.lv

LT

Korvetto yra selektyvus herbicidas, skirtas sudygsių dviskilčių piktžolių naikinimui pavasarį žieminių rapsų pasėliuose.

Preparatas skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veiklosios medžiagos: haloksifen-metilas 5 g/l (0,51%), kloprialidas 120 g/l (12,21%)

Preparato forma: koncentruota emulsija

Registracijos Nr.: AS2-51H(2020)

Pagamino data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 2 metai.

Preparatą registruo: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā: Corteva Agriscience, Tālr.: +371 2897 5155, www.corteva.lv

Preparatą registruo: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā: Corteva Agriscience, Tālr.: +371 2897 5155, www.corteva.lv

Preparatą registruo: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā: Corteva Agriscience, Tālr.: +371 2897 5155, www.corteva.lv

Preparatą registruo: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā: Corteva Agriscience, Tālr.: +371 2897 5155, www.corteva.lv

Preparatą registruo: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā: Corteva Agriscience, Tālr.: +371 2897 5155, www.corteva.lv

Preparatą registruo: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā: Corteva Agriscience, Tālr.: +371 2897 5155, www.corteva.lv

Preparatą registruo: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā: Corteva Agriscience, Tālr.: +371 2897 5155, www.corteva.lv

Preparatą registruo: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā: Corteva Agriscience, Tālr.: +371 2897 5155, www.corteva.lv

Preparatą registruo: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhageni K, Dānija

NETOKOGUS/NETO/GRYNASIS KIEKIS: 3 L